

213692

Fachrytha mac
mini: salicornioides
in Throatwort.

DYPLOM HONCROWY



GAZOWE WODY LEKARSKIE

MINERALNE SZTUCZNE,

prz y r z ą d z a n e

w ZAKŁADZIE FABRYCZNYM

WÓD GAZOWYCH

K. RZĄCY

W KRAKOWIE

według przepisów Komisji bal-
neologicznej Tow. Lekarskiego
krakowskiego.



- 1) **Woda magnezyowa**, w 1000 częściach zawiera 2,0; w szklance zaś (250,0) 0,5 węglanu magnezowego. Zwykła dawka téj soli 0,5 — 1,5. Najodpowiedniejszy sposób zadawania magnezyi.
- 2) **Woda słono-sodowa** odpowiednia w częściach składowych chemicznych wodzie **Selterskiej**, przyrządzona według ostatniego rozbioru chemicznego, wykonanego przez Freseniusa w r. 1872
- 3) **Woda litowa**. W 1000 cz. znajduje się zwykła dawka dzienna 1,0 węglanu litowego: W szklance zaś, 0,25 téj trudno rozpuszczalnej soli Zewnętrznie, do wziewania i płukania.
- 4) **Woda jodowa**. W 1000 część. zawiera 2,0, w szklance 0,5 w ćwierci szklanki 0,125 jodku potasu. Zwykła dawka téj soli 0,15 — 0,5. Dobry bardzo sposób zadawania jodku potasu. Zewnętrznie; do wziewań i płukań.
- 5) **Woda z pyrofosforanem żelazowym**. (Aqua Natri pyrophosphorici ferrati) **mocniejsza**. W 1000 częściach zawiera 0,532, w szklance 0,133 pyrofosforanu żelazowego. Zwykła dawka téj soli 0,1 — 0,5.
- 6) **Woda z pyrofosforanem żelazowym słabsza** Szczególniej w praktyce dziecięcej używana. W 1000 część. zawiera 0,266, w szklance 0,066 pyrofosforanu. Dla dzieci ćwierć fiaszki dziennie.
- 7) **Woda gorzka gazowa**, przyjemniejszego smaku, niż wody gorzkie wodziane, przyrządzona według składu węgierskich wód gorzkich. W 1000 część. zawiera 32,0 siarkanu magno-

213692

5

wego, 23,0 siarkanu sodowego, 1,0 dwuwęglanu sodowego. Wszklance zawiera 8,0 siarkanu magnewego, 5,7 siarkanu sodowego, 0,25 dwuwęglanu sodowego.

- 8) **Woda alkaliczno-sodowa** odpowiednia w częściach składowych chemicznych wodzie (**Vichy Grande-Grille i Celestins**) przyrządzona według ostatniego rozbioru chemicznego wykonanego przez p. Bouquet.
- 9) **Szczawa alkaliczno-sodowa** odpowiednia w częściach składowych chemicznych wodzie **Bilńskiej**. W 1000 częściach zawiera 0,2 siarkanu potasowego, 0,8 siarkanu sodowego 0,4 chlorku sodu, 4,0 węglaanu sodowego, 0,02 węglaanu litowego, 0,4 węglaanu wapniowego 0,15 węglaanu magnewego.

Wody wyżej wyszczególnione przez Światne Towarzystwo lekarskie krakowskie aprobowane, i do użycia w odpowiednich słabościach zalecone zostały.

CENNIK

GAZOWYCH WÓD LEKARSKICH

wyrabianych
W ZAKŁADZIE WÓD GAZOWYCH
K. RZĄCY
W KRAKOWIE.

1.	Woda magnezyowa.	100 But.	złr. 15
2.	" selcerska	" "	18
3.	" litowa	" "	15
4.	" jodowa	" "	20
5.	" z pyrofosforanem żelazowym mocniejszą	" "	25
6.	" z pyrofosforanem żelazowym słabszą	" "	22
7.	" gorzka gazowa	" "	20
8.	" Szczawa alkaliczno-sodowa na kształt Vichy Grande-Grille i Celestins		
	duża flaszką	" "	45
	mała flaszką	" "	30
9.	Szczawa alkaliczno-sodowa na kształt Billńskiej	" "	15

Próżne flaszkę opatrzone wlepetkami, przyjmują się po 3 centów.

